

Inbrengen peritoneaal katheter

U krijgt binnenkort een peritoneaal dialysekatheter. In deze folder leest u wat dit is, hoe de operatie gaat en waar u na de operatie op moet letten.

Belangrijke punten:

- U krijgt een peritoneaal katheter: een slangetje voor dialyse in uw buik.
- Vertel de arts als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt.
- Start 2 dagen voor de operatie met Movicolon: 2 keer per dag 1 zakje.
- Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis voor de operatie moet melden: u mag alléén nog water, thee, appelsap of aanmaaklimonade drinken.
- De operatie duurt 30 tot 45 minuten.
- U slaapt tijdens de operatie.
- U mag dezelfde dag of de dag erna naar huis.
- Bel de peritoneaal dialyse poli bij koorts of veel bloedverlies: 0182 – 50 54 22.

Wat is een peritoneaal katheter?

Een peritoneaal katheter is een slangetje dat via uw buikwand in de buikholte komt te liggen. U krijgt de katheter omdat u dialyse via de buikholte nodig heeft. Tijdens de dialyse loopt via dit slangetje de spoelvloeistof in en uit uw buik.

De katheter is gemaakt van soepel en zacht kunststof. Hij is in totaal 42 centimeter lang. Het deel buiten uw lichaam is ongeveer 30 centimeter.

Waar komt de katheter?

+/- 2 dagen voor de operatie komt u bij de dialyseverpleegkundige op de poli. De

dialyseverpleegkundige bespreekt met u waar de katheter geplaatst wordt.

De katheter wordt meestal als volgt geplaatst:

- Ongeveer 10 cm van uw navel, links of rechts (wat u zelf prettig vindt);
- We kijken naar de juiste plek voor de katheter als u zit en ligt. Zodat de katheter niet in een huidplooi of onder de rand van uw broek komt.

Belangrijk

- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Geef dit dan op tijd door aan uw arts. U spreekt dan samen af wat u moet doen.
- U krijgt van de dialyseverpleegkundige een recept voor Movicolon en Bactroban neuszalf. Haal dit vóór de operatie op bij de apotheek.
- Start 2 dagen voor de operatie met Movicolon: 2 keer per dag 1 zakje. Movicolon houdt vocht vast in de darm waardoor de poep zachter wordt en de darmen niet verstopen.

De dag voor de operatie

- Heeft u plekjes op uw buik, zoals roodheid, puistjes of zwelling? Bel dan de dialyseafdeling.

Wat mag u eten en drinken?

- Tot 6 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden: u mag nog eten en drinken.
- Vanaf 6 uur tot 2 uur voor het tijdstip dat u zich in het ziekenhuis moet melden: u mag alléén nog water, thee, appelsap of aanmaaklimonade drinken.

- Slokjes water mogen tot aan de ingreep bijvoorbeeld bij dorst of om medicijnen in nemen.



Wat neemt u mee naar het ziekenhuis?

- Een lijst met uw medicijnen.
- Kleding en spullen voor een nacht in het ziekenhuis.
- Uw zorgverzekeringsgegevens.
- Uw identiteitsbewijs.

Laat waardevolle spullen thuis.

Op de dag van de operatie

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de balie bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Een gastheer of gastvrouw brengt u naar de verpleegafdeling.

Voor de operatie moet u, als dat kan, nog even naar het toilet om te plassen.

De operatie

U krijgt narcose. Dat betekent dat u in een diepe slaap bent en niets voelt tijdens de operatie.

De chirurg maakt een kleine snee van ongeveer 5 centimeter onder uw navel en plaatst de katheter in uw buikholte.

De operatie duurt 30 tot 45 minuten. Na de operatie gaat u eerst naar de uitslaapkamer en daarna terug naar de verpleegafdeling.

Na de operatie

- Als alles goed gaat, mag u dezelfde dag of de dag erna naar huis.
- De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen. Die verdwijnen vanzelf.
- Laat het verband zitten tot uw eerste afspraak bij de dialyseverpleegkundige.
- U mag nog niet douchen. De dialyseverpleegkundige vertelt u wanneer dit weer mag.

Wanneer belt u het ziekenhuis?

Bel direct met de peritoneaal dialyse poli bij:

- veel bloedverlies (als het door het verband heen komt). Lekt er bloed langs de pleister? Plak daar dan de gazen die u mee heeft gekregen.
- koorts van 37,5 °C of hoger;
- verstopping van de darmen (u poept niet meer).

Belangrijke adviezen na de operatie

- Draag geen strakke kleding.
- U mag maximaal 10 kg tillen.
- Doe geen buikspieroefeningen.
- Gebruik elke dag 2 keer per dag 1 zakje Movicolon.
- Ondersteun uw buik met uw handen als u moet hoesten of niezen.

Meer informatie vindt u in de informatiemap over peritoneale dialyse, onder het hoofdstuk 'de huidpoort en lifestyle'.

Heeft u vragen of krijgt u klachten?

Neem dan contact op met de peritoneaal dialyse poli: 0182 - 50 54 22 (van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 22.00 uur).

Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Stel uw vragen dan aan de arts of verpleegkundige.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182 - 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
april 2026
08.10.018