

Adviezen voor patiënten die Strumazol® (thiamazol) of propylthiouracil® (PTU) gebruiken

U gaat het medicijn Strumazol of propylthiouracil (afkorting PTU) gebruiken. Strumazol is de merknaam van het medicijn thiamazol, het is dus hetzelfde. In deze folder leest u wat u moet weten over deze medicijnen.

Belangrijke punten:

- U gaat medicijnen gebruiken voor uw schildklier.
- De medicijnen heten Strumazol of propylthiouracil.
- De medicijnen zorgen dat u minder schildklierhormoon maakt.
- Het duurt een paar dagen tot weken voordat u zich beter voelt.
- U kunt bijwerkingen krijgen.
- Bel meteen de internist (arts) via 0182 – 50 50 05 bij:
 - jeuk, rode huid of bultjes;
 - keelpijn of koorts. Stop met de medicijnen als u niemand kunt bereiken.
- Heeft u vragen? Bel dan uw behandeld arts: 0182 – 50 50 05.

Waarom krijg ik dit medicijn?

Uw schildklier werkt te snel. Daardoor maakt u te veel schildklierhormoon aan. U kunt dan last krijgen van:

- Het snel warm krijgen;
- Gewichtsverlies;
- Veel zweten;
- Hartkloppingen;
- Trillende handen;
- Snel moe zijn.

Strumazol en PTU zorgen ervoor dat uw lichaam minder schildklierhormoon maakt.

Wanneer werkt het medicijn?

Het duurt een paar dagen tot een paar weken voordat u zich beter voelt. Hoe snel u zich beter voelt, hangt af van hoeveel schildklierhormoon er nu in uw lichaam zit. Meestal verdwijnen de klachten binnen 6 weken.

Bijwerkingen

U kunt bijwerkingen krijgen van deze medicijnen. Mogelijke bijwerkingen:

- Misselijk zijn;
- Hoofdpijn;
- Spierpijn;
- Pijn in de botten;
- Haaruitval;
- Minder goed proeven.

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na een paar weken.

Heeft u ernstige of langdurige klachten?

Neem dan contact op met uw arts.

Krijgt u jeuk, een rode huid of bultjes? Bel dan meteen uw arts. Het kan zijn dat u dan allergisch bent.

Belangrijk om te weten: Keelpijn of koorts? Meteen bellen!

Een andere bijwerking is een tekort aan witte bloedcellen. Dan kan uw lichaam zich minder goed verdedigen tegen bacteriën. U kunt dan een infectie krijgen.

Let goed op bij keelpijn of koorts. Dit kan een teken zijn van een infectie.

Wat moet u doen bij keelpijn of koorts?

Bel meteen het ziekenhuis: 0182 - 50 50 05.
Ook buiten kantoor tijden kunt u dit nummer bellen. Zeg dat u patiënt bent bij de internist en gelijk moest bellen als u keelpijn of koorts heeft. De internist bekijkt of uw bloed gecontroleerd moet worden en wanneer dat gebeurt.

Nemen wij de telefoon niet op?

Stop dan meteen met Strumazol of PTU.
Bel later opnieuw. Uw andere medicijnen mag u gewoon blijven gebruiken.
Wij vertellen u wanneer u weer mag beginnen met de Strumazol of de PTU.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over dit medicijn of deze folder? Bel dan uw behandelend arts:
0182 - 50 50 05 (bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
0182 – 50 50 50
www.ghz.nl

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juli 2025
04.07.120