

Sedatie bij een endoscopisch onderzoek

Inleiding

Uw huisarts of specialist heeft voor u een onderzoek onder lichte sedatie aangevraagd. Bij lichte sedatie wordt een rustgevend middel gegeven.

Deze folder is extra informatie op het gesprek dat u heeft gehad met uw huisarts, de specialist of de MDL-verpleegkundige.

Sedatie

Er is met u afgesproken dat u tijdens het onderzoek een lichte sedatie krijgt, er wordt dan het rustgevend middel (Midazolam) gegeven. Dit werkt snel en kortdurend, het rustgevend middel is geen narcose.

Vorbereiding

U heeft een aparte folder gekregen voor het onderzoek wat u gaat krijgen. In deze folder staan de voorbereiding afspraken voor het eten en drinken op de dag van het onderzoek. Daarnaast is onderstaande regel voor alle onderzoeken geldig:
2 uur vooraf aan het onderzoek tot aan het moment van het onderzoek mag u niet eten of drinken. U mag alleen u medicijnen nemen met een slokje water.

Wanneer u de voorbereiding niet heeft gevolgd, kunt u helaas geen gebruik maken van het rustgevend middel tijdens het onderzoek.

Hoe wordt het rustgevend middel gegeven?

U krijgt van de verpleegkundige vooraf aan het onderzoek een infuus in het bloedvat aan

de binnenkant van uw elleboog. Via het plastic buisje wat achterblijft geeft de specialist u het rustgevend middel. Bij het krijgen van het rustgevend middel wordt tijdens het onderzoek uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte gemeten.

Wat kunt u van het rustgevend middel verwachten?

U kunt op verschillende manieren op het rustgevend middel reageren. Meestal zorgt het ervoor dat u soezerig/slaperig wordt en meer ontspannen bent tijdens het onderzoek. U kunt nog wel reageren op aanwijzingen die de arts of de verpleegkundige geven, ook kan het gebeuren dat u slaapt en niets van het onderzoek merkt.

Belangrijk: De invloed van het rustgevend middel is minder bij het gebruik van slaapmedicijnen, rustgevend medicijnen en bij regelmatig alcohol- en/of drugsgebruik. Gebruik daarom twaalf uur voor tot twaalf uur na het onderzoek geen alcohol en gebruik slaapmedicijnen alleen in overleg met de arts.

Bijwerkingen

- Uw zuurstofgehalte kan door het rustgevend middel omlaag gaan. U krijgt als het nodig is extra zuurstof via een zuurstofslangetje in uw neusgaten.
- Uw bloeddruk kan door het rustgevend middel omlaag gaan. Wanneer het nodig is geven wij u via het plastic buisje in u arm of hand, vloeistof in het lichaam.

Na het onderzoek

Na de rustgevendende medicijnen blijft u na het onderzoek nog een uur ter observatie op de Scopie afdeling. Voordat u naar huis gaat krijgt u van de verpleegkundige een krentenbol of ontbijtkoek mee voor onderweg. Als u nog iets extra wilt eten, raden wij aan dit zelf van huis mee te nemen.

Het volgende geldt t/m 12 uur na het onderzoek:

- U kunt vergeetachtig en minder reactie snelheid hebben zonder dat u dit zelf merkt.
- U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
- Twaalf uur geen alcohol drinken.
- Geen belangrijke beslissingen nemen.
- Gevaarlijke machines bedienen.
- U mag niet zonder begeleiding lopend, met de taxi of openbaar vervoer naar huis.
- U moet opgehaald worden op de Scopie afdeling (route 38).

Belangrijk: Zorg dat de begeleiding die u na het onderzoek van de Scopie afdeling op komt halen ouder dan 18 jaar is. Als u vooraf aan het onderzoek geen begeleiding heeft geregeld, kunt u tijdens het onderzoek geen rustgevend middel krijgen.

Tot slot

Zijn er in de tussentijd wijzigingen in uw gezondheid? Denk aan bijvoorbeeld een hartinfarct, herseninfarct of een longontsteking. Wilt u dan contact opnemen met de Scopie afdeling?

Contact

Als u vragen heeft, neemt u contact op met de Scopie afdeling. Op werkdagen bereikbaar tussen 8:00 - 16:30 uur: (0182) 50 50 17.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:

(0182) 50 50 50.

Colofon

uitgave: Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie: Marketing & Communicatie
juli 2024
05.04.081