

Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

PATIËNTENINFO

Groene Hart Ziekenhuis 
Open voor iedereen

Clonidinetest bij kinderen

Informatie voor ouders/verzorgers

Binnenkort wordt bij uw kind een Clonidinetest gedaan. In deze folder krijgt u informatie over het onderzoek en de voorbereiding.

U kunt het beste de folder eerst doorlezen en daarna in uw eigen woorden aan uw kind vertellen hoe de Clonidinetest verloopt. Aan het einde van deze folder vindt u een aantal suggesties hiervoor. Het is belangrijk dat uw kind goed is geïnformeerd. Wanneer kinderen weten wat er gaat gebeuren, reageren ze over het algemeen rustiger.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek kunnen we bekijken of uw kind voldoende groeihormoon produceert. Dit hormoon wordt afgescheiden door de hypofyse (een klier onderaan de hersenen). Door het toedienen van medicatie wordt die klier aangezet tot het tijdelijk afgeven van extra groeihormoon. Omdat we de maximale reactie willen weten, krijgen meisjes vanaf acht jaar en jongens vanaf tien jaar voor de test extra medicijnen. Deze medicijnen zijn in tabletvorm. U krijgt hiervoor een recept mee.

Voorbereiding

- Uw kind krijgt een infuusnaald ingebracht in zijn arm of hand. Dit blijft tijdens het onderzoek zitten. Het inbrengen van het infuusnaaldje is het enige deel van het onderzoek dat pijn doet. Om deze pijn voor kinderen te verminderen, kan de prikplaats door een pleister worden verdoofd. U krijgt een recept voor deze pleister mee naar huis.
- De pleister heeft een inwerktijd nodig van ongeveer 60 minuten, brengt u deze

daarom thuis al aan. De pleister moet 15 tot 30 minuten vóór het inbrengen van de infuusnaald weer verwijderd worden. Het beste is dus om de pleister weg te halen voor u van huis vertrekt. De verdovende werking van de pleister is minstens 2 uur.

- Wanneer uw kind eet, kan dit de hoeveelheid groeihormoon in zijn bloed beïnvloeden. Daarom mag uw kind op de dag van het onderzoek (vanaf 00.00 uur) niets meer eten of drinken.

Wat neemt u mee?

Neem altijd de zorgverzekeringspapieren en het identificatiebewijs van uw kind mee, plus eventueel uw afsprakenmapje. Heeft uw kind nog geen identificatiebewijs, neemt u dan het burgerservicenummer (voorheen sofinummer) van uw kind mee. Hebt u een aanvraag van de verwijzend specialist, dan neemt u deze ook mee.

Verder neemt u mee:

- eventueel de favoriete knuffel
- speelgoed

Dag van het onderzoek

U kunt zich melden bij de receptie. Uw kind wordt tijdelijk opgenomen op de Kinderafdeling, waar het onderzoek plaatsvindt. Tijdens het onderzoek kunt u bij uw kind blijven. Omdat uw kind lang nuchter is, kan het duizelig worden. Daarom ligt het tijdens het gehele onderzoek in bed.

Een arts brengt eerst het naaldje bij uw kind in en vervolgens is er 15 à 30 minuten rust.

Daarna neemt de verpleegkundige via het naaldje, bloed af. Na een kwartier nemen wij nogmaals bloed af. Daarna krijgt uw kind medicijnen, die hij/zij moet innemen. De bloeddruk wordt gemeten één keer voordat uw kind medicijnen heeft gekregen. Afhankelijk van de bloeddrukwaarde wordt de bloeddruk nog een paar maal tussen de bloedafnames door gemeten.

Vervolgens wordt er elk half uur bloed afgenomen via het infuusnaaldje 30, 60, 90, 120, 150 en 180 minuten nadat de medicijnen ingenomen zijn. Uw kind zal door de medicatie in slaap vallen. Is uw kind jonger dan 4 jaar dan stopt het onderzoek na 120 minuten.

Na het onderzoek wordt het naaldje verwijderd en kunt u naar huis. Uw kind heeft geen speciale nazorg nodig. Doordat uw kind na het onderzoek nog erg slaperig zal zijn, is het advies om niet op de fiets naar huis te gaan.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 4 à 5 uur.

De uitslag

Ongeveer een maand na het onderzoek bespreekt de kinderarts de uitslag met u. Dit kan telefonisch of via een poliklinische afspraak. Mocht u hiervoor nog geen afspraak hebben, dan kunt u deze via de secretaresse van de kinderarts maken.

Wat kunt u uw kind vertellen?

Vertel uw kind eerlijk en in eenvoudige bewoordingen waarom het naar het ziekenhuis gaat en wat er gaat gebeuren. Herhaal de informatie, kinderen onthouden namelijk niet alles in één keer.

U kunt de volgende zaken vertellen:

- Dat uw kind en u voor ongeveer 4 à 5 uur naar het ziekenhuis gaan voor onderzoek en dat u al die tijd bij uw kind kunt blijven.
- Dat uw kind niets mag eten of drinken voor en tijdens het onderzoek, maar dat als dat echt niet gaat, het een slokje water mag nemen.

- Dat uw kind een prikje krijgt dat even pijn doet, maar dat het van de rest van het onderzoek niets voelt.
- Dat uw kind in bed ligt tijdens het onderzoek en zich rustig moet houden.
- Dat uw kind zich een beetje duizelig kan voelen omdat het niet heeft gegeten.
- Dat de zuster regelmatig bloed afneemt, maar dat dit dus geen pijn doet.
- Dat uw kind direct na het onderzoek weer mag eten en drinken.
- Dat u samen weer naar huis gaat wanneer het onderzoek klaar is.

Meer informatie

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u terecht op onze website: www.ghz.nl. Ook kunt u naar het algemene informatienummer (0182) 50 50 50.

Hebt u vragen over de Clonidinetest, belt u dan naar het secretariaat Kindergeneeskunde, telefoon (0182) 50 54 63.

Deze folder is ontwikkeld door KCHL in samenwerking met de kinderafdeling en wordt uitgegeven door de afdeling Kindergeneeskunde.

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda

Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:
(0182) 50 50 50

Colofon

uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
december 2024
08.04.039